




# Has oído hablar del ácido tranexámico

Sinónimo: AMCHA,  
Tranexamic acid (INCI).  
Es un derivado sintético del  
aminoácido "Lisina".

Como medicamento actúa  
como **antifibrinolítico** y  
**antihemorrágico**, facilitando  
la coagulación.  
Tiene un potente efecto  
inhibidor competitivo sobre la  
**activación de la fibrolisina** y,  
a concentraciones más altas,  
es un inhibidor no  
competitivo de la plasmina,  
que actúa en la liberación del  
factor de crecimiento del  
fibroblasto (FGF) estimulando  
el crecimiento del melanocito.



**Vía tópica** se usa en forma  
de crema, gel, emulsión,  
solución y mascarillas  
a **concentraciones**  
**entre 2-5 %**.

También reduce el **exceso**  
**de vascularización** que  
acompaña a ciertas  
hiperpigmentaciones.



# Para qué se utiliza vía tópica

- Melasma.
- **Previene las pecas y la hiperpigmentación** inducida por la exposición solar, la edad, hormonas, medicamentos, por el embarazo, postinflamatorias, etc.
- Como **despigmentante** para el melasma a concentraciones 3-5 %, puede ir liposomado para aumentar su eficacia. En formulación magistral siempre va acompañado de otros despigmentantes, nunca solo.

**En cosmética** se usa como **acondicionador** de la piel, manteniéndola en buenas condiciones, y también como **astringente**, ya que contrae y densifica la superficie de la piel.





# Reacciones adversas vía tópica

En algunos estudios vía tópica para el **tratamiento del melasma** se ha visto que no tiene a penas efectos secundarios, aunque sí se han descrito en algunos casos irritación transitoria de la piel.





# Contraindicaciones vía tópica

- **Hipersensibilidad** al principio activo o a sus derivados.
- Historia de **problemas de coagulación** como trombosis venosa o arterial.
- En embarazadas, la evidencia científica disponible es inconclusa e inadecuada.

**Durante el periodo de lactancia**, el uso por vía tópica se considera de muy bajo riesgo, por lo que sería **compatible y seguro**.





# Qué te recomienda tu farmacéutico

- **Seguir las recomendaciones** de uso y las condiciones de conservación del **laboratorio**.
- Hay pocos estudios, pero se ha visto que la **eficacia aumenta** cuando se usa en **combinación con otras terapias** indicadas para la **hiperpigmentación**, por ejemplo, con hidroquinona.

## Bibliografía:

- másderamtología.com
- PubMed
- Farmacia Hispalense – Revista del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla – septiembre 2018
- Ficha técnica Aemps: Amchafibrin
- e-lactancia.org
- Drugdex
- Cosmile
- MediaGraphic

