EL PAPEL DEL RADIOFARMACÉUTICO EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Autores

PAREJA DEL RÍO, F; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, A.; QUINCOCES FERNÁNDEZ, G; RAMOS-MEMBRIVE, R; PEÑUELAS SÁNCHEZ, I

(UNIDAD DE RADIOFARMACIA, SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, PAMPLONA, NAVARRA)

INTRODUCCIÓN

El auge de la **Teragnosis** en ensayos clínicos refuerza el papel del especialista en Radiofarmacia en todos los procesos relacionados con la gestión de la adquisición, almacenamiento, preparación, control de calidad, dispensación y seguimiento de su uso en este ámbito.

OBJETIVOS

Demostrar el valor añadido del papel del **radiofarmacéutico** en los ensayos clínicos con radiofármacos, tomando como ejemplo un ensayo clínico de fase 3 con un **par teragnóstico** [⁶⁸Ga]Ga-Gozetotida / [¹⁷⁷Lu]Lu-Vipitotida tetraxetano para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que sobreexpresan receptores de **PSMA** (Antígeno de Membrana Específico de Próstata).

MATERIAL Y MÉTODO

[⁶⁸Ga]Ga-Gozetotida se obtuvo mediante preparación extemporánea, eluyendo un **generador de ⁶⁸Ge/⁶⁸Ga** durante 2 min y 30 s (5 mL) e incubando 5 min a T^o ambiente. Posteriormente, se llevaron a cabo los **controles de calidad** (aspecto, pH y pureza radioquímica mediante RadioTLC), se procedió a la **liberación** de cada lote y a la **dispensación** de dosis para cada paciente. Dicho procedimiento fue previamente validado, realizando 3 procesos consecutivos de preparación extemporánea con sus correspondientes controles de calidad, siguiendo el protocolo de ensayo.

[¹⁷⁷Lu]Lu-Vipitotida tetraxetano es un radiofármaco listo para su uso, por lo que fue necesario gestionar correctamente su **solicitud**, **recepción**, **preparación de dosis individualizadas** y el **montaje del sistema de administración**, así como la **supervisión en planta** del paciente oncológico por parte del radiofarmacéutico.

RESULTADOS

1. Se validó con éxito la producción de [⁶⁸Ga]Ga-Gozetotida en nuestra Radiofarmacia, dispensando **6 dosis** del mismo (**1 dosis/paciente**) dentro de las especificaciones del ensayo (111-185MBq).
2. Se realizó correctamente la solicitud, recepción, preparación, dispensación y administración de dosis de un total de **36 ciclos** de [¹⁷⁷Lu]Lu-Vipitotida tetraxetano (**6 ciclos/paciente**) acorde a las especificaciones del ensayo (6.66-8.14GBq).
3. **Reacciones Adversas (RAMs)**: sólo uno de los pacientes desarrolló **xerostomía** (RAM grado 3), en cuyo caso, fue necesario reajustar la dosis tras valoración conjunta con el médico nuclear (5,33-6,51GBq).

CONCLUSIONES

La implicación del **radiofarmacéutico** en los ensayos clínicos con radiofármacos es **imprescindible** para garantizar que éstos son **gestionados**, **recepcionados**, **preparados**, **dispensados** y **utilizados correctamente**, la **seguridad del paciente** y la **fiabilidad de los datos** obtenidos.